sutura profunda subcanaliculata discreti, rapide crescentes, inferi infra suturam planati, ultimus permagnus, tumidus, circa umbilicum compressus, antice valde descendens sed vix deflexus. Apertura parum obliqua lunato-subcircularis, intus livido-fusca; peristoma leviter incrassatum, expansum, extus et ad columellam reflexum, marginibus conniventibus, callo tenuissimo junctis, columellari dilatato, super umbilici partem reflexiusculo.

Diam. maj. 30, min. 25, alt. 23 mm.

Hab. Astrolabe Bay, Neu Guinea (Coll. Dohrn).

Es liegen ein halbes Dutzend Exemplare vor, bis zu diam. maj. 22 mm herab. Die kleinen Stücke erinnern sehr an Helix erinaceus Pfr., doch ist der letzte Umgang immer höher und die Mündungsfärbung dunkel. Die vom Fly River stammende Helix dinodeomorpha Tapparone ist ebenfalls erheblich flacher und in der Skulptur verschieden.

Literaturbericht.

Monterosato, *Marchese di*, *Molluschi fossili quaternarii di S. Flavia.* — Sep.-Abz. aus Naturalista Siciliano. 1891. No. 5.

Zählt die Fauna eines Lagers in der Nähe von Altavilla auf. Die meisten Arten sind heute noch lebende, die ausgestorbenen mit solchen von Altavilla identisch. Als neu beschrieben werden Nucula apicina. Alvania catographa. Es werden 126 sämmtlich kleine Arten aufgeführt.

Dautzenberg, *Ph.*, *Mollusques recuillis au Congo par M. E. Dupont, entre l'embouchure du fleuve et le Kassai.* — In Bullet. Acad. Roy Belgique (3). XX. p. 566—581.

Als neu beschrieben werden Achatina oblitterata, Unio stagnorum, Galatea Tuckeri, sowie als neue Gattung *Pseudogibbula* Duponti, eine Süsswasserlittorinide, welche in der Gestalt an Gibbula erinnert und einen starken Spindelzahn hat. Sie lebt an Felsen bei Vivi. — Aus einem postpliocänen Lager bei Banana, etwa

15 Meter über dem heutigen Flussspiegel gelegen, werden ausserdem noch beschrieben Galatea Duponti und Fischeria Lenzi.

Simroth, *Dr. H.*, *die Nacktschnecken der portugiesisch-azorischen Fauna in ihrem Verhältniss zu denen der palaearktischen Region überhaupt.* — In Nova Acta der Ksl. Leop.-Carol. Deutschen Academie der Naturforscher. Bd. LVI. No. 2. 4°. (p. 201—424 mit Tab. 9—18).

Der Raum gestattet uns nicht, hier eine eingehende Analyse dieser gründlichen und hochwichtigen Arbeit zu geben; wir empfehlen unseren Lesern angelegentlichst ihr eifriges Studium. Als neu beschrieben werden: Agriolimax immaculatus p. 286 t. 3 fig. 9. 10. 17. 19 aus Portugal; — Agr. Maltzani p. 290 vom Monchique; — *Limacopsis* n. gen. für Limax Schwabii und creticus p. 308; — Arion minimus, auch durch Deutschland verbreitet, p. 333; — Geomalacus Oliveirae p. 359 t. 6 fig. 9, Portugal. Von besonderem Interesse sind die sechs Kärtchen, welche die Verbreitung der einzelnen Nacktschneckenfamilien und Gattungen darstellen.

Bulletins de la Société Malacologique de France. VII. 1890. 374 pp. avec 8 planches.

Ancey, C. F., Nouvelles Contributions malacologiques. Suite IV. Mollusques nouveaux de Hawai, de Madagascar et de l'Afrique équatoriale.

Baichère, E., Nayades de l'Aude. Suite II.

Bofill, A., Contributions à la Faune malacologique de la Catalogne. Suite II.

Bourguignat, *J. R.,* des formes européennes trochohyalinoides, classées jusqu'à présent sous le nom generique de Conulus.

Caziot, Description de quelques Mollusques fossiles du terrain lacustre des Baux de St. Remy en Provence.

Dubois, R., Etude sur la nature des valves ou pièces accessoires chez les Pholadides.

Fagot, P., Proménades malacologiques dans le Sud de la France. Suite II.

Florence, Description d'un Planorbe nouveau pour la Faune francaise.

Gourdon, M., Catalogue raisonné des Mollusques de la Barousse (Hautes Pyrenées).

Jousseaume, F., Espèces terrestres de Massaouah, de Perim et Aden, suivies d'un supplément à le faune malacologique de la Peninsule arabique.

Locard, A., Description des espèces françaisrs appartenant au genre Mactra.

Mollerat, E., Ovulidae et Cypraeidae des côtes maritimes du departement du Var.

Servain, G, des Acephales Lamellibranches du système europèen.

Dall, W. H., and H. A. Pilsbry, on some recent Japanese Brachiopoda, with a description of a species believed to be new. — In Proc. Acad. Philadelphia 1891. p. 165—171. pl. 4.

Als neu beschrieben wird Terebratula Stearnsii. — Die Autoren stellen die pacifischen Arten von Magasella, Terebratella und Eudesia (= Waldheimia) zusammen, wie sie durch Vergleich grosser Serien jetzt als Entwicklungsstufen derselben Arten erkannt sind. Von den acht Formenreihen kennt man jetzt nur eine in allen drei Entwicklungsstufen (Magasella laevis Dall = Terebratella pulvinata Gould = Eudesia venosa Sol.), fünf auf zwei Stufen, Terebratella coreanica Reeve bis heute nur in dieser Form.

Dall, W. H., Notes on some recent Brachiopodes. In Proc. Acad. Philad. 1891. p. 172—175. pl. 4 ex parte.

Behandelt Terebratella transversa Sow. (= caurina Gould), occidentalis Dall, lenticularis Desh (= pulvinata Gould), und Megerlia monstruosa Scacchi, die im Mittelmeer, im Tiefwasser des atlantischen Oceans, in Westindien und an den Maskarenen vorkommt.

Martens, Ed. von, Landconchylien des indischen Archipels. — Sep.-Abdruck aus Dr. Max Weber, Zoologische Ergebnisse einer Reise in Niederländisch-Ostindien. Bd. II. Leiden 1891. gr. 8⁰. p. 209—268. tab. 12—14.

Prof. Weber hat ausser auf den bekannteren grösseren Sundainseln besonders auf Celebes, Flores und der kleinen malakozoologisch noch ganz unbekannten Saleyer-Insel gesammelt. Die Zahl der von ihm mitgebrachten Landschnecken — die Süsswasserschnecken werden später behandelt — beträgt 57. Davon werden als neu beschrieben: Cyclotus Floresianus p. 211 t. 12 fig. 1—3, Flores; — C. biangulatus p. 204 t. 12 fig 5—9, Saleyer; —

Lagochilus ciliocinctus var. quinquefilosus p. 216 t. 12 fig. 10—13, Luvu auf Celebes; — Alycaeus celebensis p. 217 von ebenda; — Pupina lobifera p. 219 t. 12 fig. 14. 15, Sumatra; — Helicina exserta p. 221 t. 12 fig. 16—19, Saleyer; — Xesta Wallacei var. bicingulata p. 224 t. 13 fig. 15, Maros auf Celebes; — X. nemorensis var. Endeana p. 225 t. 12 fig. 9, Endeh auf Flores; — H. floresiana p. 230 t. 14 fig. 1—4; — H. vomer p. 230 t. 14 fig. 5—8; — Macrochlamys minuta p. 231 t. 12 fig. 20. 23; — Trochomorpha costulata p. 232; — Helix (Rhagada) floresiana p. 235 t. 14 fig. 13. 14, Flores; — H. (Eulotella) textoria p. 236 t. 14 fig. 9—12; — Amphidromus Annae p. 240 t. 14 fig. 19—22; — Clausilia obesa var. gracilior p 244 t. 14 fig. 15—18, Sumatra; — Cl. alticola p. 245, Sumatra. — Der Beschreibung der neuen Arten fügt Martens ein wie immer äusserst sorgfältig gearbeitetes Verzeichniss aller aus den behandelten Gebieten bekannten Landschnecken und ein Literaturverzeichniss bei.

Berichtigung.

Im Nachrichtsblatt dieses Jahres, No. 7 u. 8, S. 129 Zeile 4 von unten ist ausgefallen und einzusetzen:

(1842) Hartmann, Erd- und Süsswasser-Gasteropoden der Schweiz, als Helicella obvia (S. 148 u. s. f.).

Anzeigen.

Eine gut gepflegte **Conchylien-Sammlung** von 1650 div. Arten nebst schöner Einrichtung und Schrank zu verkaufen. Näheres theilt mit Max Cropp in Erfurt.

HERMANN ROLLE,
Naturalienhandlung
BERLIN NW., Emdener Strasse No. 45

empfiehlt den geehrten Herren Sammlern sein reichhaltiges Lager in **Land-, Marine- und Süsswasser-Conchylien** zu civilen Preisen. Grössere und kleinere Sammlungen werden auf Wunsch billigst zusammengestellt unter specieller Berücksichtigung der charakteristischen Species. — Aus allen Welttheilen fortlaufend neue Eingänge speciell von Japan und China, den Philippinen und Neu-Caledonien etc. etc. Preislisten gratis. — Fehlendes Material nehme gerne in Tausch. Den Herren Reisenden ertheile Aufträge und kaufe ganze Ausbeuten.

Eingegangene Zahlungen.

v. Fritsch, H. Mk. 18.— ; Schröder, N. 6.—; Ihering R. Gr. 18.—; Könnecke, Br. 12.—.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.